
ORNISINJ

Carduelis carduelis balcanica
STANDARD

Lo standard per Carduelis carduelis balcanica è il risultato di discussioni con numerosi ornitologi, allevatori e giudici ornitologici e si basa principalmente sulla descrizione scientifica originale della sottospecie. Questo standard nasce dall'esigenza di uniformare l'allevamento della sottospecie C. c. balcanica, alla luce dell'elevato numero e della varietà di cardellini «piccoli» esposti alla mostra internazionale OrniSinj. Animati dal desiderio di preservare la biodiversità, auspichiamo che questo standard costituisca una buona base per il successivo allevamento selettivo.

Per dimensioni, *Carduelis c.* ***balcanica*** corrisponde alla sottospecie *nominale Carduelis carduelis carduelis* (L.). La differenza principale rispetto alla sottospecie nominale consiste nella colorazione più smorzata e grigiastra di tutte le parti «brune» del corpo. Il dorso bruno non presenta la tonalità rossastra caratteristica della forma nominale, ma è leggermente grigio-olivastro. Nella parte inferiore, *Carduelis c.* ***balcanica*** si distingue per le macchie pettorali più estese, per la maggiore estensione della colorazione sui fianchi e per il collare più marcato attorno al gozzo. Anche qui il bruno non è cannella-rossastro come in Carduelis c. carduelis, bensì molto più scuro e grigiastro, a eccezione del collare sotto il collo, altrettanto chiaro e bruno-rossastro che nella forma nominale. Un'altra caratteristica di balcanica è la pulizia delle zone bianche, leggermente bianco-grigiastre nei maschi, mentre nelle femmine appaiono un po' più sporche e grigiastre.



TAGLIA: 12–13 cm.
FORMA: Compatta e slanciata, pur mantenendo un aspetto leggermente tarchiato.
PORTAMENTO: Eretto e vivace.

BECCO: Bianco-grigiastro fino a rosa tenue (color avorio), con punta piuttosto lunga e scura. La sua lunghezza non altera l'armonia della forma dell'uccello.
OCCHI: Bruno scuro.
TESTA: Nel maschio, le redini e le setole alla base del becco sono nere e la maschera è rosso carminio, con contorni meno arrotondati, estesa oltre l'occhio. Nella femmina la maschera raggiunge soltanto la metà dell'occhio, è più arrotondata e le redini e le setole sono bruno-grigiastre. Il disegno nero a croce, a forma di T rovesciata sulla parte superiore della testa, è costituito da una larga fascia nero intenso che si estende lateralmente e incornicia le guance bianco-grigiastre. Nelle femmine si tollera un nero meno marcato nel disegno a croce sulla testa.
COLLO: Bianco, con una fascia stretta bruno chiaro sulla parte posteriore del collo (nuca).
DORSO: Bruno con una leggera sfumatura grigio-olivastra (non è tollerato il bruno castano con sfumature rossastre tipico della sottospecie nominale).
GOLA: La maschera rossa e il bianco della gola sono ben definiti e nettamente separati.
PETTO: Bruno-grigiastro smorzato, con una piccola zona bianca pettorale. Il collare pettorale è pronunciato, continuo e ben definito, ma di un bruno leggermente più chiaro (con sfumature rossastre come nella sottospecie nominale).
FIANCHI: Bruni, ben evidenti e nettamente delimitati; si estendono fino al groppone. È preferibile un accenno di striature bruno-grigiastre sui fianchi.
VENTRE: Bianco.
ALI: Remiganti primarie nere; le barbe esterne delle remiganti centrali sono gialle, mentre la remigante più esterna è priva di giallo. Le estremità delle penne alari presentano una macchia terminale bianco-grigiastra; nelle femmine è tollerata una tonalità bianco-brunastra. Nel maschio le copritrici della spalla sono nere, mentre nella femmina sono bruno-nere con sfumature verde-olivastre.
CODA: Penne nere; le due timoniere esterne presentano una macchia bianca allungata sul vessillo interno. I margini terminali delle timoniere presentano una macchia bianca; le copritrici superiori della coda sono nere con bordo terminale giallastro e quelle inferiori sono chiare con bordo terminale beige.
ZAMPE: Bruno chiaro.
UNGHIE: Bruno scuro.

DIFETTI TIPICI:

Lunghezza non conforme.
Forma non conforme (eccessivamente affusolata o eccessivamente massiccia; simile alla sottospecie frigoris).
Tonalità bruna priva della componente grigiastra (bruno castano con sfumatura rossastra).
Zone bianche decisamente impure.
Fianchi assenti o eccessivamente accentuati.
Maschera non ben definita o delimitata.
Zona bianca pettorale non chiaramente visibile.
Petto e fianchi con sfumature non corrette (il collare non è più chiaro del resto della zona bianca pettorale; macchie nere sul petto).
Disegni irregolari su ali e coda.
Colorazione non corretta della fascia sulla nuca (infiltrazione di penne dal giallo al rosso).

NOTA TECNICA:

Durante il giudizio occorre prestare particolare attenzione a:

Lunghezza dell'uccello (12–13 cm). Gli esemplari che, per dimensioni (lunghezza e forma), appartengono chiaramente ad altre sottospecie (frigoris, parva o tschusii) devono essere declassati.

Colorazione bruno-grigiastra delle zone «brune» (dorso, petto e fianchi).

Presenza di bianco più pulito (guance, zona bianca pettorale e ventre), soprattutto nei maschi.

SCHEDA DI GIUDIZIO – Carduelis carduelis balcanica

Voce	Descrizione della voce	Ideale	Inizio	Massimo
Disegno	Disegno	30	27	29
1. Disegno del petto e dei fianchi	Disegno della zona bianca pettorale e dei fianchi	11	10	11
2. Disegno della testa	Disegno della maschera e della croce	11	10	11
3. Disegno di ali e coda	Estensione e forma della banda alare gialla e delle macchie bianche su ali e coda	8	7	7
Colore	Colore	30	27	29
4. Colore della testa	Colore della maschera, della croce, delle guance, delle redini e della nuca	10	9	10
5. Colore di dorso, petto e fianchi	Colore bruno del dorso, dei fianchi e del petto, compresi la zona bianca pettorale e il ventre	10	9	10
6. Colore di ali e coda	Colore delle ali, delle bande alari gialle e delle macchie bianche su ali e coda	8	7	7
7. Colore di zampe, unghie e becco	Colore di zampe, unghie e becco	2	2	2
Forma e taglia	Forma e taglia	20	18	19
8. Lunghezza (12–13 cm)	Lunghezza dell'uccello (12–13 cm)	12	10	11
9. Forma	Forma generale dell'uccello e armonia in rapporto alle dimensioni del becco	8	8	8
Piumaggio	Piumaggio	10	9	10
10. Piumaggio	Piumaggio	10	9	10
Portamento, condizione e impressione generale	Portamento, condizione e impressione generale	10	9	10
11. Portamento a Adattamento, Condizione Generale	Portamento a Adattamento, Condizione Generale	10	9	10
	Totale:	**100**	**90**	**95 ***

* Il punteggio massimo totale (95) non corrisponde alla somma dei punteggi massimi delle singole voci.

Edizione 1 del 17.10.2026.

Preparato per OrniSinj da:
Davor Skejić
OMJ/COM gruppo D
ZOSH/HOS gruppi D, G e H