
ORNISINJ

Carduelis carduelis balcanica
STANDARD

Standard za *Carduelis carduelis* ***balcanica*** je plod diskusija s nizom ornitologa, uzgajivača i ornitoloških sudaca, a utemeljen je prvenstveno na originalnom znanstvenom opisu podvrste. Ovaj standard je proizašao iz potrebe za standardiziranim uzgojem podvrste *C. c. balcanica* koja je motivirana velikim brojem i raznolikošću izloženih 'malih' češljugara na međunarodnoj izložbi OrniSinj. Vođeni željom za očuvanjem biološke raznolikosti, nadamo se da će ovaj standard biti dobar temelj za selektivni uzgoj koji slijedi.

Carduelis c. ***balcanica*** veličinom odgovara nominalnoj podvrsti *Carduelis carduelis carduelis* (L.). Osnovna razlika od nominalne podvrste je u zagasitijem i sivljem obojenju svih 'smeđih' dijelova tijela. Smeđa leđa nemaju crvenkast ton karakterističan za nominalni oblik, već su blago maslinastosiva. Na donjoj strani, *Carduelis c.* ***balcanica*** se razlikuje po većim pjegama na grudima, širem obojenju bokova tijela i izraženijem prstenu oko guše. I ovdje smeđe nije crvenkasto-cimetne boje kao kod *Carduelis c. carduelis*, već mnogo tamnije i sivlje - osim ogrlice ispod vrata, koja je isto tako svijetla i crvenkastosmeđa kao kod nominalnog oblika. Nadalje, podvrstu *balcanica* odlikuje čistoća bijelih zona koje su blago sivkasto bijele kod mužjaka, dok ženke imaju nešto prljavije sivkasto bijele zone.



VELIČINA: 12-13 cm.
OBLIK: Kompaktan i vitak, a ipak pomalo zdepast.
DRŽANJE: Uspravno, pokretno.
KLJUN: Bijelo-siv do prigušeno ružičast (boje bjelokosti) s prilično dugim, tamnim vrhom. Duljinom ne narušava oblik ptice.

OČI: Tamnosmeđe.

GLAVA: Kod mužjak su uzde i čekinje (uz bazu kljuna) crne, a maska je karmin-crvena, s manjim zaobljenjima, i proteže se iza oka. Kod ženki maska doseže samo do pola oka, više je zaobljena, a uzde i čekinje su sivkasto smeđe. Križna oznaka, u obliku obrnutog slova T, na gornjem dijelu glave, široka, tamno crna traka koja se proteže bočno i uokviruje sivkasto bijele obraze. Kod ženki se tolerira slabije naglašena crna boja križne oznake na glavi.

VRAT: Bijeli, svjetlo smeđe obojeni pojas (uska traka) na stražnjem dijelu vrata (šiji).

LEĐA: Smeđa s laganom nijansom maslinasto sive (ne tolerira se kestenjasto smeđa s nijansom crvenkaste kao kod nominalne podvrste).

GRLO: Crvena maska i bijela boja grla dobro definirani i jasno razgraničeni.

PRSA: Zagasito smeđe sivkasta s manjom bijelom gljivom. Izražena vratna ogrlica koja je neprekinuta i jasno definirana, ali malo svjetlije smeđa (s primjesama crvenkaste nijanse kao u nominalne podvrste).

BOKOVI: Smeđi, jasno izraženi i dobro definirani - protežu se do stražnjice. Naznaka sivkasto-smeđih pruga na bokovima se preferira.

TRBUH: Bijel.

KRILA: Primarna krilna pera crna, vanjska zastavica krilnih pera u sredini žuta, vanjsko pero nema žutu obojenost. Vrhovi pera krila imaju sivkasto-bijelu završnu mrlju, dok se smećkasto bijela tolerira kod ženki. Kod mužjaka je pokrovno perje na ramenima crno, dok je kod ženki crno smeđe s primjesama maslinastozelene.

REP: Perje crno, dva vanjska pera imaju izduljenu bijelu mrlju na unutarnjoj zastavici. Završni rubovi repnih pera imaju bijelu završnu mrlju, gornja repna pokrovna pera su crna sa žućkastim završnim rubom, a donje repno pokrovno perje je svijetlo s bež završnim rubom.

NOGE: Svijetlo smeđe.

NOKTI: Tamno smeđi.

TIPIČNI NEDOSTACI:

Neodgovarajuća dužina.
Neodgovarajući oblik (pretjerano vretenast ili pretjerano nabijen; nalik podvrsti *frigoris*).
Nijansa smeđe bez sivkastog tona (kestenjasto smeđa s crvenkastom nijansom).
Izrazito nečiste bijele zone.
Nedostaju bokovi ili su prenaglašeni.
Maska nije dobro definirana/razgraničena.
Gljiva nije jasno izražena.
Prsa i bokovi nisu ispravno nijansirani
(vratna ogrlica nije svjetlija od ostatka gljive, crne mrlje na prsima).
Nepravilne oznake na krilu/repu.
Neispravna boja pojasa na šiji (infiltracija žutog do crvenog perja).

TEHNIČKA NAPOMENA:

Prilikom ocjenjivanja potrebno je pripaziti na:

Dužinu ptice (12-13 cm). Primjerke koji veličinom (duljinom i oblikom) evidentno pripadaju drugim podvrstama (*frigoris*, *parva* ili *tschusii*) treba deklasirati.
Smeđesivkastu obojanost 'smeđih' zona (leđa, prsa i bokova).
Zastupljenost čišće bijele boje (obraza, gljive i trbuha) - naročito kod mužjaka.

OCJENSKA LISTA - Carduelis carduelis balcanica

Stavka	Opis stavke	Ideal	Start	Maksimum
Crtež	Crtež	30	27	29
1. Crtež prsa i bokova	Crtež prsne gljive i bokova	11	10	11
2. Crtež glave	Crtež maske i križa	11	10	11
3. Crtež krila i repa	Rasprostiranje i oblik žute krilne pruge i bijelih oznaka (mrlja) na krilima i repu	8	7	7
Boja	Boja	30	27	29
4. Boja glave	Boja maske, križa, obraza, uzda i zatiljka	10	9	10
5. Boja leđa, prsa i bokova	Smeđa boja leđa, bokova i prsa, uključujući bijelu gljivu i trbuh	10	9	10
6. Boja krila i repa	Boja krila, žutih krilnih pruga i bijelih oznaka (mrlja) na krilima i repu	8	7	7
7. Boja nogu, noktiju i kljuna	Boja nogu, noktiju i kljuna	2	2	2
Oblik i veličina	Oblik i veličina	20	18	19
8. Duljina (12-13 cm)	Duljina ptice (12-13 cm)	12	10	11
9. Oblik	Generalni oblik ptice i sklad iz aspekta veličine kljuna	8	8	8
Perje	Perje	10	9	10
10. Perje	Perje	10	9	10
Držanje, kondicija i opći utisak	Držanje, kondicija i opći utisak	10	9	10
11. Držanje, kondicija i opći utisak	Držanje, kondicija i opći utisak	10	9	10
	Ukupno:	**100**	**90**	**95 ***

* Maksimalna vrijednost ukupnog broja bodova (95) nije zbroj maksimalnih vrijednosti po stavkama.

Izdanje 1 od 17.10.2026.

Za OrniSinj pripremio:

Davor Skejić
OMJ/COM grupa D
ZOSH/HOS grupe D, G i H
skejicdavor@gmail.com